

Тестовые вопросы для самоконтроля

1. Рекомендации по ведению больных перед оперативным вмешательством:

- а) отсутствуют;
- б) устаревшие (1997 года);
- в) приняты в 2014 году.

2. Антитромбоцитарные препараты перед оперативным вмешательством с высоким риском тромботических осложнений:

- а) не отменять, так как возрастает риск периоперационного инфаркта миокарда;
- б) клопидогрель отменить, ацетилсалициловую кислоту (АСК) оставить;
- в) отменить, однако сроки зависят от препарата, например, АСК – за 7 суток, клопидогрель – за 5, а тикагрелор – за 3 суток;
- г) отменить за 5–7 суток.

3. Блокаторы β -адренорецепторов (β -адреноблокаторы) перед оперативным вмешательством:

- а) необходимо отменить, учитывая риск развития артериальной гипертензии;
- б) необходимо продолжить прием или (при отсутствии противопоказаний) назначить.

4. Эффективные β -адреноблокаторы перед оперативным вмешательством:

- а) существуют доказательства высокой эффективности бисопролола;
- б) доказаны преимущества метопролола по сравнению с другими β -адреноблокаторами;
- в) все имеют подобную эффективность в адекватных дозах.

5. Положительное влияние назначения β -адреноблокаторов перед операцией наблюдается при условии назначения препарата:

- а) свыше 3 месяцев до операции;
- б) более 1 суток до операции;
- в) более 2 недель до операции.

6. ЭКГ перед операцией проводится пациентам:

- а) которые имеют клинические факторы риска и/или направляются на операцию высокого риска;
- б) не имеют клинические факторы риска и направляются на операцию низкого риска.

7. К операциям высокого риска относятся:

- а) офтальмологические операции;
- б) каротидная эндартеректомия;
- в) операции на периферических сосудах.

8. Минимальный срок назначения статинов перед операцией:

- а) за 1 месяц до операции;
- б) за 1 неделю до операции;
- в) за 2 недели до операции.

9. Профилактическое назначение нитратов перед операцией:

- а) показано пациентам с миокардиальной ишемией;
- б) эффективность не доказана;
- в) показано пациентам без ишемии.

10. Варфарин перед оперативным вмешательством необходимо отменить:

- а) за 1 сутки до операции;
- б) за 5 дней до операции;
- в) не отменять.