

Тестовые вопросы для самоконтроля

1. Целесообразно ли проводить ургентное эхокардиоскопическое исследование у постели больного в отделении неотложной помощи пациентам с подозрением на тупую травму сердца?

- а) да;
- б) нет;
- в) нет, так как нет регламентирующих исследование документов.

2. Достаточно ли при проведении ургентной эхокардиоскопии исследования по упрощенному протоколу (FAST), или необходимо полноценное исследование?

- а) всегда достаточно;
- б) нужно использовать только полноценный протокол;
- в) как правило, протокола FAST достаточно для принятия оперативных решений, так как он был специально разработан для отделений неотложной помощи.

3. Нужно ли больному с контузией сердца проводить мониторинг ЭКГ в первые сутки после травмы?

- а) нет;
- б) да;
- в) только при наличии аритмии.

4. Обязательно ли больному с контузией сердца проводить суточное мониторирование ЭКГ перед переводом из отделения интенсивной терапии?

- а) да;
- б) нет;
- в) желательно, но не обязательно.

5. У пострадавшего в ДТП с повреждением грудной клетки об руль при проведении рентгенографии органов грудной клетки фиксируется расширение средостения. При осмотре в этой области подкожная гематома. Наиболее верное суждение врача?

- а) это тень подкожной гематомы, проведение СКТ не целесообразно;
- б) это неправильное позиционирование при проведении исследования рентгенолаборантом клиники неотложной помощи, надо переделать снимок;
- в) нельзя исключить наличие гематомы средостения вследствие разрыва аорты. Целесообразно проведение СКТ с контрастированием.