

## Тестовые вопросы для самоконтроля

**1. Тип дисфункции миокарда, который наблюдается при рестриктивной кардиомиопатии (РКМП):**

- а) систолическая;
- б) диастолическая.

**2. Что лежит в основе патогенеза эндокардита Леффлера:**

- а) отложение железа;
- б) отложение амилоида;
- в) длительная гиперэозинофилия.

**3. Где распространен эндомикардиальный фиброз:**

- а) в умеренных широтах;
- б) в экваториальных районах;
- в) в северных широтах.

**4. Где в миокарде откладывается амилоид:**

- а) в интерстиции;
- б) внутри миофибрилл;
- в) периваскулярно.

**5. У кого чаще развивается болезнь Фабри:**

- а) у женщин;
- б) у мужчин;
- в) одинаково часто у мужчин и женщин.

**6. Признаки застоя при РКМП чаще бывают:**

- а) в малом кругу кровообращения;
- б) в большом кругу кровообращения;
- в) не наблюдается признаков застоя.

**7. Для амилоидоза характерно:**

- а) тяжелая артериальная гипертензия;
- б) мягкая артериальная гипертензия;
- в) ортостатическая гипотензия.

**8. По данным ЭКГ для амилоидоза не характерно:**

- а) низковольтная ЭКГ;
- б) выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка;
- в) признаки перегрузки левого и правого предсердий.

**9. При рестриктивном типе нарушения диастолы соотношение E/A:**

- а) менее 1,0;
- б) 1,0–2,0;
- в) более 2,0.

**10. Специфические изменения, которые могут наблюдаться на ЭхоКГ при эндомикардиальном фиброзе:**

- а) зернистость миокарда;
- б) облитерация полости желудочка;
- в) асимметричная гипертрофия межжелудочковой перегородки.

**11. Неинвазивный метод исследования, наиболее информативный для выявления миокардиального фиброза:**

- а) спекл-трекинг ЭхоКГ;
- б) биопсия миокарда;
- в) МРТ сердца.