

наркотичних засобів, психотропних речовин на їх митну територію;

- їх перевезення дозволятиметься лише на замовлення або безпосередньо особам, які мають ліцензію на обіг таких наркотичних засобів та (або) психотропних речовин;
- їх використання дозволятиметься здійснювати в медичній практиці виключно у формі лікарських засобів, дозволених до застосування МОЗ у встановленому порядку.

## Транзит

Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюватиметься за умови обов'язкової їх охорони та супроводження відповідними підрозділами Національної поліції.

## Реалізація і придбання медичного канабісу

Придбання фізичною особою за медичними показаннями лікарських засобів на основі медичного канабісу здійснювати-

меться за електронним рецептом лікаря. Роздрібна реалізація здійснюватиметься в аптечних закладах усіх форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.

Порядок реєстрації, ведення обліку і зберігання, а також правила оформлення електронних рецептів на медичний канабіс визначатимуться МОЗ.

Загалом у Комітеті Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування відзначили, що вимоги до діяльності з обігу медичного канабісу в Україні будуть доволі жорсткими.

Державна регуляторна служба України, у свою чергу, провела аналіз тексту законопроекту № 7457, за результатом якого встановила, що він містить норми, які фактично дублюють дозвільні документи при отриманні ліцензій, що наразі діють.

Тому відомством направлено до Парламенту власні пропозиції для їх внесення при розробці тексту законопроекту до другого читання.

*Підготовлено ТОВ «Медікс Груп»*

## Біліарна патологія очима фармацевта

**Під біліарною патологією розуміють низку захворювань жовчного міхура та жовчовивідних шляхів. До найпоширеніших уражень цієї групи належать функціональні розлади жовчного міхура та сфінктера Одді, хронічний безкам'яний холецистит та холангіти, холестероз жовчного міхура, жовчнокам'яна хвороба, постхолецистектомічний синдром. Значно рідше відмічають ксантогранулематозний холецистит, первинний склерозуючий холангіт та онкологічні ураження біліарного тракту (поліпи, рак тощо).**

Установлено, що провідним фактором у біліарному літогенезі є моторна дисфункція жовчного міхура та сфінктерного апарату жовчних шляхів. При адекватному консервативному лікуванні можливі відновлення функції жовчного міхура, повна елімінація кристалів холестерину, пігментних кристалів і солей кальцію з його порожнини. Це дозволяє запобігти розвитку жовчнокам'яної хвороби та оперативному втручання.

*В аптечному асортименті є низка засобів, які застосовуються при біліарній патології, і їх, згідно з Протоколом, може порадити фармацевт:*

- холеретики, які посилюють секрецію жовчі гепатоцитами (ті, що містять жовчні кислоти, їх солі та жовч) – дегідрохолева кислота, Холензим, ліобіл, Алохол; препарати рослинного походження на основі квіток цмину піщаного, стовпчиків і приймочок кукурудзи, валеріани, пижма звичайного, м'яти перцевої, шипшини, Холагол, берберину сульфат, петрушка; синтетичні – Циквалон; гідрохолеретики – мінеральні води з жовчогінною дією – Нафтуса, Єсенутики № 17 та № 4, Слов'янська).

Слід зазначити, що прийом рослинних препаратів на основі шипшини доцільно рекомендувати разом з настоями плодів кмину, коріандру або кропу для зменшення метеоризму:

- холекінетики – сприяють виділенню жовчі у кишечник – магнію сульфат, ксиліт, сорбіт;

- холеспазмолітики, які розслаблюють гладкі м'язи жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і сфінктера Одді – папаверину гідрохлорид, дротаверину гідрохлорид;
- усунути посилене газоутворення та пригнічувати процес бродіння в кишечнику, що часто супроводжує біліарні порушення, можуть комбіновані препарати, що містять сухий часник (наприклад, Алохол).

Прийом жовчогінних засобів має супроводжуватися достатнім споживанням рідини – 1,0–1,5 л рідини на добу (більшу частину вживати в першу половину доби) та тривати до 20 діб.

Рекомендуючи вищезазначені препарати, фармацевт має пам'ятати, що вони протипоказані при обтурації жовчних шляхів, у період загострення захворювань нирок, печінки, жовчного міхура, жовчних і сечових шляхів, шлунка і дванадцятипалої кишки, при схильності до діареї, синдромі подразненої товстої кишки, виразкової хвороби. А також слід уникати одночасного застосування жовчогінних із протимікробними і нестероїдними протизапальними засобами з метою запобігання додатковому навантаженню на печінку.

Якщо при прийомі жовчогінних лікарських засобів не зникають скарги на нудоту, тяжкість у правому підребер'ї, спостерігається розлад кишечника або погіршується самопочуття пацієнта – слід терміново звернутися до лікаря.

*Підготовлено ТОВ «Медікс груп»*